

BALON INTRAGASTRICO: Evaluación e implantación.

PACIENTES QUE VIVEN CERCANOS A CLINICA OBESITAS

1. Evaluación por Cirujano, Psicólogo y Dietista-Nutricionista
2. Tratamiento con Omeprazol 20mg, o similar, 10 días antes de la implantación.
3. Ayunas de 6 horas.
4. Implantación con sedación y vuelta al domicilio.
5. Dieta líquida durante 7 días y blanda durante 7 días mas. Dieta normal.
6. Consultas de seguimiento y apoyo durante 6 meses.
7. Explantación a los 6 meses:
 - Dieta líquida 3 días antes
 - Ayuno de 6 horas
 - Explantación con sedación y vuelta al domicilio.

BALON INTRAGASTRICO: Evaluación e implantación.

PACIENTES QUE VIVEN MUY ALEJADOS DE CLINICA OBESITAS

1. Evaluación PRELIMINAR mediante "Historia Clínica Virtual" (e.mail/fax + teléfono)
2. Tratamiento con Omeprazol 20mg, o similar, 10 días antes de la implantación.
3. 1º desplazamiento a Clínica Obésitas:
 - Evaluación por Cirujano, Psicólogo y Dietista-Nutricionista
 - Ayunas de 6 horas.
 - Implantación con sedación y vuelta al domicilio u Hotel.
 - (Se organiza para realizarse todo en un día)
 - (Puede ser conveniente no emprender viaje de vuelta el mismo día)
4. Dieta líquida durante 7 días y blanda durante 7 días mas. Dieta normal.
5. Consultas de seguimiento y apoyo durante 6 meses.
 - Consultas virtuales (e.mail/fax + teléfono)
 - Consultas presenciales.
6. Resto igual

